



**TOUS  
au  
COMPOST!**

**12 mois au compost  
et au jardin !**

# Avril

## Tonte de pelouse

Les paillis de tontes conviennent à tous les espaces du jardin (potager, verger, massif, haie, petits fruits...) :

- ➔ Paillis de tontes fraîches : 1 cm d'épaisseur sur le potager, 3 à 5 cm aux pieds des haies, au verger ou dans l'espace de petits fruits,
- ➔ Paillis de tontes séchées : jusqu'à 10 cm d'épaisseur quelques soient les espaces.

**La tonte de 1 are de pelouse doit servir à pailler 0,5 à 1 are de potager, MAIS pas moins !**



### Avantage

En se décomposant, les tontes libèrent des nutriments directement assimilables par les plantes.

### Remarques et astuces

- Sur les espaces nus du potager, les tontes d'avril relaient les feuilles décomposées à cette période. D'avril à septembre, elles répondent aux besoins des légumes en nutriments. Une fois les semis de carottes ou de panais effectués (levée après plusieurs semaines), le jardinier peut épandre une très fine couche de tonte (moins d'1 cm). Les semis lèveront sans problème au travers du paillis desséché. Les tontes peuvent aussi être déposées entre les rangs des légumes ou aux pieds des légumes de "l'espace Ratatouille" (tomates, aubergines, courgettes ...).
- Le passage fréquent de la tondeuse, une fois tous les 10 jours, évite la présence de graines dans les déchets de tonte. En présence de plantes montées en graines, un premier passage à la tondeuse est fait avec une coupe la plus haute possible. Cette tonte peut être compostée. 8 à 10 jours après, un deuxième passage permet de récupérer une tonte sans graine,
- Les coupes au-dessus de 60 mm limitent la pousse des graminées et diminuent la présence de plantes en rosette (pissenlits, plantains...),
- Laissés sur place, les déchets de tontes fertilisent les pelouses et favorisent les graminées au détriment des autres plantes (pissenlit, trèfle...).

**Le déchet organique du moment est toujours le meilleur !**



# Mai

## Mauvaises herbes non montées en graines

Les paillis de mauvaises herbes non montées en graines peuvent convenir à tous les espaces du jardin. Ce n'est qu'une question de style ! L'idéal est de couper au collet les plantes annuelles avec un outil tranchant ; elles sont laissées sur place. Les racines laissées dans le sol sont dévorées par les vers de terre endogés.

### Avantage

En se décomposant, les mauvaises herbes libèrent des nutriments directement assimilables par les plantes. De plus, elles restituent des sels minéraux au sol dans lequel elles les ont prélevés.

### Remarques et astuces

Les herbes montées en graines sont exportées, puis sont déposées dans un seau rempli d'eau. 2 à 3 semaines après, ce purin « d'un autre genre » est versé entre les rangs des légumes ou sur le tas de compost. Les graines ont perdu leur pouvoir germinatif.



**Le déchet organique du moment est toujours le meilleur !**

# Juin

## Déchets de tailles des arbustes à floraison printanière et des haies au carré

Sont concernés les arbustes (moins de 2 m) à floraison printanière. Les déchets de taille sont déposés dans tous les espaces du jardin et en particulier dans le potager aux pieds des tomates, courges ou autres légumes-fruits. Le broyage est fait de mai à septembre puis l'épandage est fait rapidement.

### Avantage

Les branches sont en feuilles. En se décomposant, les feuilles riches en nutriments compensent les prélèvements de ceux du sol faits par les organismes pour décomposer le broyat. Il n'y a pas de problème de faim d'azote à cette période.

### Remarques et astuces

- En raison de très nombreux oiseaux qui élisent leur domicile dans les arbustes et les arbres, il est préférable de les tailler ou de les élaguer qu'à partir d'août (suivre l'Arrêté préfectoral). Pour les arbustes de faibles volumes (moins de 2 m) présents dans les espaces ornementaux des jardins de maisons individuelles, il est important de vérifier l'absence de nids de ces précieux auxiliaires du jardinier.



**Le déchet organique du moment est toujours le meilleur !**



# Juillet

## Fanes et autres déchets de légumes

Les fanes ou autres déchets de légumes conviennent au paillage du potager mais ils doivent être indemnes de maladies ou de prédateurs. Ils peuvent être laissés sur place entiers ou broyés à la cisaille ou à la tondeuse. Au contraire, les déchets malades ou infestés sont compostés. Mélangées à des tontes de pelouse, l'augmentation de la température du tas engendrée sur plusieurs jours éliminent les maladies et les ravageurs.

### Avantage

En se décomposant, les fanes de légumes libèrent des nutriments directement assimilables par les légumes. De plus, elles restituent les stocks de sels minéraux du sol dans lequel elles les ont prélevés.

### Remarques et astuces

- Les déchets odorants (fanès de carottes ou de céleri, feuilles de tomates...) déposés entre les rangs d'autres légumes perturbent les insectes prédateurs. Les feuilles de céleris ou de carottes sont déposées entre les rangs des poireaux. Les feuilles de tomates sont déposées aux pieds des choux pour limiter les invasions d'aleurodes (petites mouches blanches).

- Si les déchets en bac ou le tas de compost ne chauffent pas en raison de l'excès de déchets « bruns » (déchets grossiers et carbonés), il est préférable de ne pas y mettre les déchets de légumes malades (avec mildiou, oïdium...). Mieux vaut les déposer à l'automne, broyés et en fines couches dans d'autres espaces du jardin comme aux pieds des haies d'arbustes. Les vers de terre s'en occuperont gustativement !



**Le déchet organique du moment est toujours le meilleur !**

# Août

## Déchets de tailles

Un broyage spécifique de branches de feuillus d'un diamètre inférieur à 7 cm correspond au fameux BRF (Bois Raméal Fragmenté). L'épaisseur du broyat est inférieur à 4 mm. La part des résineux peut cependant représenter 10 à 20%. La « fraîcheur » est importante : les branches taillées sont broyées dans la semaine et l'épandage doit être fait le jour qui suit ! Le BRF peut être laissé en surface ou incorporé à la griffe dans les premiers cm du sol. Il faut compter 30 litres par m<sup>2</sup>. La période idéale est d'août à octobre car le sol est encore chaud et « très vivant » pour lancer la décomposition du broyat.



### Avantage

La technique du BRF est très efficace pour (re)constituer les stocks d'humus du sol. Toutefois, une faim d'azote est souvent à craindre l'année qui suit.

### Remarques et astuces

- Attention, le besoin de BRF ne doit pas justifier l'élimination ou le massacre de haies, véritables refuges d'une biodiversité auxiliaire du jardinier !

- Un broyat qui a chauffé en tas, issu de branches d'un fort diamètre ou de troncs, stocké depuis plusieurs semaine voire des mois, ou de conifères n'est pas du BRF !

**Le déchet organique du moment est toujours le meilleur !**



# Septembre

## Déchets de fauche

Contenant beaucoup de graines de graminées et de plantes sauvages à fleurs, le paillis de fauche est très peu utilisé au jardin ornamental ou au potager. Il peut être déposé aux pieds des haies ou de ceux des arbres fruitiers ou sur leur rang. Sinon, il est préférable de composter en tas les déchets de fauche. L'élévation de la température détruit une grande majorité des graines, mais pas en totalité !

### Avantage

Toutefois, les déchets de fauche peuvent, en mélange avec d'autres déchets végétaux d'automne comme les feuilles mortes, être mis en tas en long (andain). Ce dernier sert d'espace pour la plantation de courges ou de potirons au printemps suivant. Tous les ans, cet espace peut recevoir ces déchets de fauche puis les plantations de courges.

### Remarques et astuces

- Si un jardinier souhaite installer une prairie sauvage sur un espace de son jardin, il épand une fauche de prairie sur le sol nu pendant un mois afin que le semis naturel puisse se faire. C'est gratuit et le résultat est garanti !
- Les déchets de fauche sont valorisés au potager pour la culture sous foin.



## Fruits pourris ou malades

Les fruits pourris ou malades ne servent pas au paillage. Ils sont compostés en mélange avec des feuilles.

### Remarques et astuces

- Les fruits pourris peuvent être étalés à l'automne aux pieds des haies pour nourrir la faune auxiliaire. Ils peuvent aussi être mis en tas en mélange avec des feuilles mortes (mettre des coups de bêches pour écraser les fruits) ; des courges y seront repiquées en mai.

**Le déchet organique du moment est toujours le meilleur !**

# Octobre

## Les déchets de plantes en pots

**Les paillis de déchets de plantes en pots conviennent à tous les espaces du jardin. Les déchets sont broyés à la tondeuse thermique.**

### Avantage

En se décomposant, les déchets de plantes en pots libèrent des nutriments directement assimilables par les plantes (parties tendres) et participent à la reconstitution des stocks d'humus du sol (parties dures).

### Remarques et astuces

- En Alsace, la quantité de déchets de jardinières et plus particulièrement de géranium est considérable. Comment bonifier cette ressource ? Le jardinier coupe les tiges à l'automne, puis les broie à la cisaille ou à la tondeuse pour faire un paillis protecteur et nourricier pendant la saison hivernale. Ce broyat posé sur les feuilles évite leur envol. Il met à part le terreau contenant des racines. Au printemps et après tamisage, il l'utilise pour les semis en godets ou directement en place. Les racines sont compostées.



**Le déchet organique du moment est toujours le meilleur !**



# Novembre

## Les feuilles mortes

**Les paillis de feuilles mortes conviennent à tous les espaces du jardin. L'épaisseur du paillis doit correspondre à celle des feuilles perdues naturellement par un arbre. Une épaisseur de 5 à 10 cm de feuilles est suffisante. Mieux vaut constituer le paillis en plusieurs fois.**

### Avantage

En se décomposant, les feuilles mortes protègent efficacement le sol durant la période hivernale et reconstituent voire améliore le stock d'humus.

### Remarques et astuces

- Les feuilles coriaces ou de grande taille (laurier, châtaignier, érables, platane, catalpa...) sont broyées à la tondeuse avant le paillage pour favoriser leur décomposition.
- Les feuilles malades peuvent servir de paillis dans des espaces du jardin dont elles n'ont pas l'origine. Par exemple, les feuilles malades d'arbres fruitiers peuvent être déposées sur les parcelles du potager. En fine couche, les vers de terre vont les broyer, puis les digérer. Ces auxiliaires du jardinier sont de véritables aseptiseurs !
- Les feuilles de noyers ne sont pas utilisées pour le paillage, sauf en faible quantité. Elles sont plutôt compostées en tas en mélange avec des déchets de fauche ou de tonte.



**Le déchet organique du moment est toujours le meilleur !**

# Novembre

## Biodéchets de cuisine

**Les préparations et les restes de repas ne servent pas comme paillis au jardin. Ils sont compostés principalement en bac (compostier).**

### Avantage

En valorisant par compostage les biodéchets de cuisine et une petite quantité de déchets verts, jardiniers ou jardinières possèdent un amendement qui augmente le taux d'humus dans le sol et donc améliore sa structure.


L'humus libère des nutriments directement assimilables par les plantes.

### Pour faire simple avec un seul bac !

Pour valoriser les biodéchets de cuisine et des faibles quantités de déchets verts, un seul bac suffit : le fameux compostier en bois ou éventuellement en plastique. On le place à l'ombre d'une haie de feuillus pour qu'il bénéficie de l'ombre en été et le maximum de soleil l'hiver.

**Quels déchets ?** Tous les déchets verts conviennent mais en petite quantité. Les déchets grossiers seront cisailés menus. Côté bio-déchets de cuisine, il faut interdire tous les déchets carnés, les déchets à base de farine comme le pain et les restes de repas, sinon des rats sont à craindre. Ces rongeurs sont très opportunistes. Ainsi, les fanes de légumes, les épluchures, le marc de café, les sachets de thé et les coquilles d'œufs sont parfaits. On peut y ajouter en petite quantité les déchets d'essui-tout, de boîte à œufs ou de carton neutre.

**Comment composter ?** Dès qu'on apporte un seau de biodéchets, il faut rajouter un seau de structurant comme des feuilles mortes, du broyat de bois, des gros copeaux de bois ou des morceaux de carton de boîte à œufs. Cet apport et les derniers sont mélangés à la fourche pour bien aérer le tout et ainsi de suite au fur et à mesure des dépôts. Si le compost en maturation paraît trop sec, on l'arrose. S'il paraît trop humide, on apporte des déchets bruns comme des feuilles mortes.



**Le déchet organique du moment est toujours le meilleur !**



# Novembre

## Biodéchets de cuisine (suite)

### Quel est le tempo du compostage avec un seul bac ?

Le jour où il tombe le plus de feuilles, à savoir entre le 25 octobre et le 15 novembre, le jardinier ou la jardinière vide complètement son compostier.

- Les déchets les moins décomposés, les derniers apports, seront remis dans le compostier.
- La partie très décomposée au fond du bac est mise de côté et servira pour les semis de printemps et notamment pour les semis des courges coureuses comme les butternutt. Ce compost est mélangé avec de la terre de jardin.
- Enfin la partie la plus importante qui est plus ou moins décomposées est épanchée sur le potager. On n'oublie pas de couvrir ce compost de feuilles mortes pour faciliter son évolution et surtout le protéger des pluies d'automne et d'hiver.

### Remarques et astuces

- C'est la quantité qui va déterminer la technique. Les grosses quantités de déchets organiques sont principalement valorisés en tas en long (l'andain de déchets verts). En plus faible quantité, ils sont valorisés dans plusieurs bacs avec un bac d'accumulation qui sera transvasé dans un bac de maturation (ne pas oublier le bac ou le tas de structurant).



**Le déchet organique du moment est toujours le meilleur !**

# Décembre

## Déchets de plantes de massifs

**Les déchets de plantes de massif conviennent à tous les espaces du jardin. Pour rendre homogène l'aspect du paillis, il est broyé à la cisaille ou à la tondeuse.**

### Avantage

En cours de saison ou à l'automne, les déchets de massif broyés à la cisaille et laissés sur place constituent un excellent paillis protecteur et nourricier. Pour éviter le semis de certaines plantes, le jardinier peut exporter au sécateur leurs parties aériennes avant de les broyer.

### Remarques et astuces

- Les plantes aromatiques (sauge, lavande, mélisse, romarin...) forment d'excellents paillis odorants qui peuvent être déposés entre les rangs des légumes. Les huiles essentielles perturbent les insectes prédateurs des plantes potagères. Les pieds de lavande produisent de grandes quantités de déchets car le jardinier doit les rabattre sérieusement pour éviter leur dégarnissement. Ils sont rabattus de moitié après la floraison en août ou en septembre ou durant l'hiver. Les déchets de taille peuvent être séchés, puis broyés. Ils sont gardés au sec pour servir de paillis protecteur et nourricier au printemps suivant.



**Le déchet organique du moment est toujours le meilleur !**



# Janvier

## Déchets d'arbres résineux


Les résineux concernent les conifères tels les sapins, ifs, thuyas, pins, cyprès, mélèzes... En grande quantité, les tailles de résineux sont exportées en déchèterie. En faible quantité (moins de 10% à 20%), ils peuvent être mélangés aux paillis de feuillus et ainsi servir pour tous les espaces du jardin. D'ailleurs, un paillis de résineux (jusqu'à 1 cm) ne pose aucun problème, même au potager. C'est toujours une question de quantité ! En cas de doute, le jardinier peut épandre un peu de cendre pour corriger une éventuelle acidité.

### Avantage

En quantité et broyés grossièrement, les déchets de résineux se décomposent peu !

### Remarques et astuces

- Avec les tailles de thuyas broyées grossièrement, le jardinier peut remplir des chemins ou des sentiers décaissés sur une profondeur de 10 à 15 cm. Herbicide, ce broyat laissera pousser peu d'herbes. A l'inverse de sentiers enherbés, l'eau ne sera pas puisée pas l'herbe (effet de mèche) au détriment des plantes.



**Le déchet organique du moment est toujours le meilleur !**



# Février

## Les aiguilles de pins, sapins ou autres conifères

Les paillis d'aiguilles de pin, de sapin ou d'autres conifères conviennent principalement aux massifs de plantes de terrains acides (hortensia, rhododendrons, azalées...). Une épaisseur de 10 cm est conseillée.

### Avantage

Les aiguilles de pin ou de sapin ne se décomposent pas rapidement.

### Remarques et astuces

- Les aiguilles de pin épandues en fines couches limitent les attaques de limaces. Mélangées à de la cendre et du marc de café, le jardinier crée un cocktail efficace contre ces gastéropodes.

- Le jardinier peut en épandre dans son jardin (moins de 1 cm) sans risquer d'augmenter l'acidité du sol, surtout si ce dernier a un pH idéal entre 6,5 et 7.

- Avant de planter des fraisiers, un paillis de broyat de branches de feuilles mortes couvert d'aiguilles est déposés sur le sol. Il est favorable aux besoins des fraisiers, limite les attaques de limaces, évite la stagnation d'eau et crée un «environnement propre» pour les fraises.



**Le déchet organique du moment est toujours le meilleur !**



# Mars

## Déchets de tailles des arbustes à f braison estivale, fruitiers ou au carré, ou déchets d'élagage d'arbres

**Broyés, les déchets de tailles ou d'élagages conviennent à tous les espaces du jardin (potager, massif, verger, petits fruits...). Sont concernés : les arbres fruitiers (pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers...), les petits fruits (cassis, groseille...), les arbustes des haies taillées ou champêtres (lauriers, photinias, troènes, charmille, houx, noisetiers, sureaux...) et les arbres de grand volume (noyers, tilleuls, charmes, hêtres, chênes, peupliers, bouleaux...). Attention, les résineux (sapins, pins, thuyas...) ne peuvent représenter que 10 à 20 % de ces déchets.**

### Avantage

Le broyage peut s'effectuer depuis décembre. Il est directement épandu dans différents espaces du jardin, ou peut être conservé en tas et utilisé au fur et à mesure des besoins. Ce déchet est plutôt déposé aux pieds des plantes bien enracinées (arbustes...).

### Remarques et astuces

- La décomposition du broyat est faible en raison des températures basses. Au printemps, elle rentrera en concurrence avec les légumes (semis ou repiquage). Dès avril, il est indispensable d'épandre des tontes de gazon (1 cm) et de les mélanger au broyat pour compenser les prélèvements de nutriments. .

Attention, les paillis de pailles de céréales peuvent provoquer ce même désagrément. Se rajoute celui de la rémanence des pesticides utilisés pour traiter les céréales en agriculture conventionnelle.

- Les déchets de taille en fagots, les branches ou les troncs peuvent servir pour le chauffage ou la cuisson au bois. Les branches les plus longues sont utilisées comme piquets ou pour les aménagements.

- Un tas de bois ou de fagots, ou une haie sèche (Haie de Benjes) est un excellent refuge pour la faune auxiliaire.



**Le déchet organique du moment est toujours le meilleur !**

# Merci pour votre attention jardinesque !

*« Le jardinage naturel n'est pas un style  
mais un comportement joyeux  
qui améliore le pouvoir de non-achat  
et le lien social »*

